


Météo de l'herbe du 3 juillet 2018

Coup de chaud sur la prairie !

Avec des températures caniculaires et l'absence de précipitations depuis 3 semaines, les croissances sont proches de zéro, voire très faibles en sols profonds. Le retour d'averses ou d'orages annoncés serait les bienvenus pour les repousses, d'autant que la mise aux regains se fait attendre...



Repères conduite du troupeau : du 25 juin au 2 juillet 2018


	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,8	24,3	23,2	24,1	20,5	24,6
TB Moyen (g/kg)	36,2	38,1	36,9	37,6	37,0	37,1
TP Moyen (g/kg)	31,8	32,5	32,1	32,3	31,1	32,5
Valorisation ration de base (kg)	12,9	13,4	16,0	15,7	12,8	13,3
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	50,7	61,2	40,2	45,4	49,6	63,9
g de concentrés / kg de lait	185	209	145	153	172	204

Point de vue de l'éleveur : Philippe Munnier– Rioz (70)


« La diminution de la croissance de l'herbe puis une pousse trop abondante ont engendré une grosse perte de lait (je suis passé de 8 000 à 7 000 kg de lait) qu'on a du mal à rattraper malgré le pâturage des 95 vaches à la traite, les parcelles débrayées et l'alimentation à l'auge (enrubanné, maïs ensilage et grain, méteil et tourteau). En revanche les taux sont stables (TB : 39,5 ; TP : 33). Avec la chaleur les vaches pâturent surtout la nuit et restent dans le bâtiment ou se mettent à l'abri des arbres la journée. » Propos recueillis par Margaux Reboul Salze (CA 70)

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

