


## Météo de l'herbe du 15 mai 2018

### Retour des précipitations bénéfique.

« Le retour des pluies est favorable à la croissance de l'herbe après une période sans précipitations, mais elle s'accompagne aussi de fraîcheur au niveau des températures. Les cycles de pâturage tournant se poursuivent en plaine et démarrent en montagne. La production laitière est au rendez-vous avec des niveaux de complémentation proches des repères de saison (90 à 120 g/litre) La fauche de refus si nécessaire va limiter la prolifération par les graines des plantes non consommées du fait de leur toxicité (renoncules) ou d'autres vivaces non consommables (chardons, rumex).



### Repères conduite du troupeau : du 7 au 14 mai 2018


	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	26,0	26,5	26,6	26,2	24,8	26,5
TB Moyen (g/kg)	35,6	37,3	36,5	38,1	36,5	37,1
TP Moyen (g/kg)	33,2	33,4	33,0	32,2	32,9	33,0
Valorisation ration de base (kg)	17,4	15,0	18,7	20,0	17,2	18,2
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	40,5	56,7	38,3	28,9	42,3	43,8
g de concentrés / kg de lait	147	205	137	117	146	137

**Point de vue de l'éleveur :** Mickaël PONCET du GAEC ferme de la sablière à Desertin (haut-jura). Témoignage recueilli par Dorian Lefebvre EVA JURA


« Je suis sorti jour et nuit depuis le 1er mai. On a fait déprimer pendant 2 semaines nos parcelles de foins. Depuis dimanche on est rentré dans notre première rotation de pâturage avec une entrée à environ 10cm et une sortie à 6cm, les paddocks font 0.70ha ce qui fait 2 are/vache/jour. On a eu un peu de mal à descendre plus bas, on estime que cela est dû au climat de ce week-end (pluie fine et froid). Nous sommes plutôt satisfaits de la réponse en lait du troupeau en ce début de saison. »

Groupe Herbe Franche-Comté

### Courbe de croissance de l'herbe en plaine



### Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



### Courbe de croissance de l'herbe en montagne

