


Croissance quasi nulle

Le retour de températures très élevées, supérieures à la normale et l'absence de précipitations ont une nouvelle fois stoppé la croissance des prairies. Cette tendance au beau temps semble se profiler jusqu'à fin septembre hormis quelques orages probables. L'affouragement sur les stocks d'hiver reste de mise pour nourrir les troupeaux. Eviter le surpâturage des prairies « grillées ».



Repères conduite du troupeau : 7 au 14 septembre 2020

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,0	23,5	22,3	24,9	18,8	22,9
TB Moyen (g/kg)	37,0	40,3	38,2	39,8	39,4	40,4
TP Moyen (g/kg)	32,8	33,6	33,4	33,4	32,9	33,7
Valorisation ration de base (kg)	10,6	11,8	13,5	14,2	10,7	11,5
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	66,8	68,5	55,8	63,0	63,4	64,7
g de concentrés / kg de lait	224	227	185	274	204	220

Point de vue de l'éleveur : GAEC Beguiot à Cosges (39), zone de plaine.

« Le pâturage en cette période est très compliqué et très limité. Les vaches sont sur une "parcelle parking" depuis le 15 juillet pour ne pas dégrader davantage le système racinaire des plantes sur les autres parcelles et ainsi maintenir un potentiel de repousse. La ration actuelle est composée de foin le matin et de maïs vert le soir, ainsi que 4,5 kg de concentrés. La ration permet de maintenir un niveau de production de 24,5 kg de lait, un très bon TP (34,5) et un bon état corporel des animaux.

Depuis le début de la saison de pâturage, les mesures d'herbes et les échanges hebdomadaires avec le conseiller ont été très bénéfiques. Cela a permis d'organiser et d'affiner le pâturage afin d'optimiser toujours plus la valeur de l'herbe pâturée (pâturage au fil pour chaque repas). Ainsi du 15 mars au 30 juin, les 65 vaches ont pâturé sur 14 ha de prairies temporaires (avec 2 kg de foin à l'aube). Le chargement important et la bonne gestion du pâturage ont également permis de limiter la fauche des refus (1 seule fois cette saison contre 4 broyages/fauche avant la mise en place du suivi) sans pour autant avoir de variation importante de production laitière. »

Propos recueillis par Timothé Baudot, Conseiller à Evajura.

Groupe Herbe Franche-Comté

Réalisé avec le soutien financier de :



