


Météo de l'herbe du 11 mai 2021

Temps de pousse !

Avec le retour des précipitations et de températures plus élevées, bien que fluctuantes..., les croissances d'herbe au pâturage sont relancées et doivent permettre de reprendre une rotation plus adaptée sur les parcelles (retour tous les 18 à 21 jours au printemps). Pour bien valoriser l'herbe, rappelons les hauteurs d'entrée (10-12 cm herbomètre, équivalent bas-mollet) et celles de sortie de parcelle (5-6 cm herbomètre, équivalent talon de la botte). En conditions très humides, pensez à préserver le potentiel des pâtures pour la saison (chemins d'accès, points d'eau, temps de présence plus restreint si besoin...).



Repères conduite du troupeau : 3 au 10 mai 2021

| | 39 Foin | 39 Ensilage | 25-90 Foin | 25-90 Ensilage | 70 Foin / Enrubannage | 70 Ensilage |
|----------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Lait moyen / vache traite (kg) | 25,8 | 27,1 | 26,5 | 28,9 | 26,4 | 27,3 |
| TB Moyen (g/kg) | 36,3 | 39,3 | 37,4 | 39,3 | 37,5 | 38,4 |
| TP Moyen (g/kg) | 33,8 | 34,5 | 33,6 | 33,5 | 34,1 | 34,4 |
| Valorisation ration de base (kg) | 16,6 | 13,7 | 17,1 | 14,7 | 8,7 | 13,3 |
| Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) | 48,5 | 70,4 | 50,0 | 71,0 | 41,7 | 68,4 |
| g de concentrés / kg de lait | 161 | 231 | 161 | 234 | 152 | 224 |

Point de vue de l'éleveur : Damien Grandmougin, GAEC Grandmougin (Creveney) : "J'ai loupé le créneau en mars pour lâcher donc les 90 VL sont sorties début avril. La transition a été courte puisqu'elles étaient dehors jour et nuit au bout de 2-3 jours à l'herbe. J'avais peur d'être débordé par l'herbe mais la période de gel a bien calmé la pousse. Le 14/04 on était à 32 kg de lait/VL (mois moyen du troupeau : 5 mois), on a diminué l'ensilage d'herbe progressivement (plus du tout dans la ration depuis le 15/04). Elles ont 8 kg brut de maïs ensilage, 4 kg brut de maïs épi, 4 kg de concentrés et 1 kg de tourteau en plus des 30 ares/VL au pâturage. On a perdu en TB (moins de 38) et en TP (moins de 36) pendant la période de froid d'où l'importance de maintenir de la fibre." Propos recueillis par Margaux Reboul Salze, CA70



Retrouvez le dernier épisode de Radio Prairies sur la [chaîne YouTube du Groupe Herbe Franche-Comté](#)


Groupe Herbe Franche-Comté

Réalisé avec le soutien financier de :




RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

