


Météo de l'herbe du 27 mai au 3 juin 2025

Chaleur et humidité favorables à la croissance

Le retour de précipitations orageuses, après un épisode de chaleur à l'ascension propice à la fenaison, relance les croissances d'herbe au pâturage. Une séquence de temps plus humide et frais entraîne une pause dans les récoltes. La fauche des refus permet de repartir avec une parcelle propre, aux repousses homogènes. En plaine, les premières parcelles de regain arrivent en complément du pâturage.





Repères « Conduite du troupeau »

	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	24,7	26,8	25,1	25,7	24,6	25,3
TB (g / kg)	35,8	37,9	36,7	39,2	36,6	38,4
TP (g / kg)	33,7	34,2	34,3	33,5	33,4	33,4
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	95	144	98	165	108	158
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	63	82	63	98	67	97
g concentrés / kg de lait	173	213	156	217	204	240

Point de vue de l'éleveur : Angélique BAKKER du GAEC BAKKER à Dompierre-sur-Mont (39)

« Nous avons pu faucher nos foins il y a 3 semaines, mais le séchage a été parfois compliqué, même en vrac. Pour le moment, le pâturage tournant est bien géré avec peu de refus grâce à une gestion au fils avant. Les vaches produisent 24L en moyenne avec des taux TB/TP à 37/33. Avant de partir au champ, elles consomment environ 1 kg de foin et nous les sortons à peine plus tard le matin pour qu'elles aient toutes le temps de passer au DAC pour recevoir un mélange de notre méteil complété par une VL 17, ce qui représente 150g de concentré/L de lait. »

Propos recueilli par Floriane Marsal, conseillère à BIO Bourgogne-Franche-Comté
Groupe Herbe Franche-Comté



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

