

Météo de l'herbe du 08 au 15 juillet 2025


Reverdissement minimum !

Quelques précipitations orageuses et le retour de températures estivales plus « normales » ont assuré un peu de reverdissement traduisant un minimum de croissance. Le déficit de pluie subsiste au niveau des sols (crevasses...). Malgré le pâturage des regains, la distribution à l'auge reste parfois nécessaire. Les récoltes de 2ème coupe et les moissons se poursuivent. La météo de l'herbe fait une pause estivale et reprendra en semaine 35.

Croissance de l'herbe

(kg MS/ha/jour)

Du 08/07 au 15/07/2025



	Sols superficiels*		Sols profonds	
	Moy	Écart	Moy	Écart
Plaine	13	-7	15	-7
Plateau	15	-10	22	-6
Montagne	21	-11	-	-

Moy : Croissance moyenne en kg MS /jour/ha

Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Repères « Conduite du troupeau »

	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	20,1	23,4	ND	ND	ND	ND
TB (g / kg)	36,6	38,9	ND	ND	ND	ND
TP (g / kg)	31,6	32,4	ND	ND	ND	ND
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	115	173	ND	ND	ND	ND
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	71	109	ND	ND	ND	ND
g concentrés / kg de lait	189	260	ND	ND	ND	ND

ND : Non Disponible

Point de vue de l'éleveur : GAEC Boudet à Bornay (39)

« Les vaches continuent de pâturer jour et nuit mais l'avance d'herbe s'amenuise fortement, pour compenser, elles reçoivent 6kg de foin par jour et sont bien complémentées (3kg de céréales, 800g de tourteaux et 1kg de VL en moyenne).


Quelques vaches ont déclenché des mammites à cause des fortes chaleurs et la production en lait a diminué sur le mois de juin. Pour améliorer leurs conditions de vie pendant les pics de température, des ventilateurs ont récemment été installés dans le bâtiment et le troupeau a été rentré les après-midis les plus chauds.

Les foins et regains se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Cette année la qualité est au rendez-vous et les quantités tout à fait satisfaisantes pour assurer l'année. On espère plus qu'une 3ème coupe soit possible à l'automne lorsque les pluies reviendront pour finaliser les stocks. »


Propos recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d'Agriculture du Jura.

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

