


Météo de l'herbe du 25 mai au 1^{er} juin 2026

Chaleur et humidité favorables à la croissance

Le retour de précipitations orageuses, après un épisode de chaleur propice à la fénaison, relance les croissances d'herbe au pâturage surtout en sols superficiels. Avec par exemple des croissances de 45 kg de MS / ha / jour, 36 ares mis à disposition par vache permettent de couvrir les besoins à hauteur de 16 kg de MS. Une séquence de temps plus humide et frais bienvenue pour les repousses entraîne une pause dans les récoltes. En plaine où la fénaison est quasi terminée, les premières parcelles de regain arrivent en complément du pâturage.



Repères « Conduite du troupeau »

	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	25.5	26.3	26.8	30.8	25.1	28.9
TB (g / kg)	36.7	39.2	36.9	37.6	36.7	38
TP (g / kg)	33.5	33.5	34.2	33.5	33.8	33.3
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	104	162	92	140	142	128
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	65	101	58	76	95	74
g concentrés / kg de lait	173	235	147	199	253	200

Point de vue de l'éleveur : Gaec Bakker (500 mètres d'altitude) Dompierre sur Mont (39)

« Le pâturage s'enchaîne sans difficulté pour le moment. Les vaches produisent 25 litres / jour avec des TB et TP respectivement à 39.7 et 34. On leur donne un peu de foin avant les traites et une complémentation à hauteur de 180 g / litre à base de notre méteil et de VL18. Les foins se sont achevés ces derniers jours. Avec 3 semaines d'avance, il y a de la qualité et de la quantité, excepté pour les sols plus froids et tardifs. Nous avons décidé de laisser sécher entre 4 et 5 jours pour le foin en bottes pour les rentrer avec 75% d'humidité. Aussi, nous faisons le choix de faucher assez haut, c'est-à-dire à une hauteur minimale de 7 cm, pour ne pas tirer sur les réserves de la plante et assurer une bonne repousse pour la suite. »

Propos recueilli par Floriane MARSAL, conseillère élevage à Bio Bourgogne-Franche-Comté
Groupe Herbe Franche-Comté

